GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule

Chlorhydrate de lopéramide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule ?
3. Comment prendre GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ? APEUTIQUE

ANTI-DIARRHEIQUE.

Traitement de courte durée des diarrhées aiguës passagères de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Ce traitement est un complément des mesures diététiques : lire attentivement le chapitre "Prendre des précaution particulières".

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au lopéramide ou à l'un des autres composants contenus dans GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule,
- si vous souffrez d'une maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de recto-colite hémorragique.

Faites attention avec GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule :

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

ATTENTION : vous ne devez pas prendre ce médicament :

- en cas de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- si votre diarrhée survient au cours d'un traitement antibiotique (risque d'atteinte sévère du côlon).

De même vous devez arrêter ce traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- en cas de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,
- en cas de constipation ou de distension abdominale,

- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est à dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN en cas de maladie du foie car une surveillance médicale pendant le traitement est nécessaire.

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.
Il est nécessaire de :
- se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (boire au moins 2 litres),
- s'alimenter le temps de la diarrhée,
- supprimez les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.
- privilégiez les viandes grillées, le riz.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament contient du **LOPERAMIDE**.
D'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Attention, ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges risquant d'être dangereux lors de la conduite de véhicules et de l'utilisation de certaines machines.

Informations importantes concernant certains composants de GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule
Liste des excipients à effet notoire : Lactose.

3. COMMENT PRENDRE GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule ?

N'UTILISEZ PAS CE MEDICAMENT CHEZ L'ENFANT (MOINS DE 15 ANS).

Posologie
RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT de plus de 15 ans.
Commencez par 2 gélules en une seule prise (soit 4 mg de lopéramide).
Si la diarrhée continue : après chaque selle non moulée, prenez 1 gélule supplémentaire, mais :
- ne jamais dépasser 6 gélules par jour,
- ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Mode d'administration
Voie orale.
Avalez les gélules à l'aide d'un verre d'eau.

Fréquence d'administration
Prenez 1 gélule après chaque selle non moulée mais :
- ne jamais dépasser 6 gélules par jour.
- ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.

Si vous avez pris plus de GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule que vous n'auriez dû :
En cas de surdosage accidentel, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN.

Si vous oubliez de prendre GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Constipation et/ou distension du ventre,

- Douleurs du ventre, ballonnements, nausées, vomissements, sécheresse de la bouche,

- Réactions allergiques (éruption cutanée, urticaire et exceptionnellement choc allergique grave),

- Fatigue, somnolence, vertige.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule ?

La substance active est :
Chlorhydrate de lopéramide……2 mg
Pour une gélule.

Les autres composants sont : Lactose monohydraté, amidon de riz, talc, stéarate de magnésium.

Qu'est ce que GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélules, en boite de 12.

Titulaire

BOUCHARA-RECORDATI
Immeuble Le Wilson
70, avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX

Exploitant

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI
Immeuble Le Wilson
70, avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX

Fabricant

Laboratoires BTT
Z.I. de Krafft
67 150 ERSTEIN

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mai 2013

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).